

核准日期, 2007年02月08日

核准日期: 2007年02月00日 修改日期: 2009年05月13日, 2010年09月25日, 2014年05月29日, 2014年08月18日, 2016年09月18日,

2016年11月23日,2019年01月04日,2019年09月16日,2020年09月04日

疹风疹联合减毒活疫 Measles and Rubella Combined Vaccine, Live

说明书

【药品名称】

通用名称: 麻疹风疹联合减毒活疫苗 英文名称: Measles and Rubella Combined Vaccine, Live

汉语拼音: Mazhen Fengzhen Lianhe Jiandu Huoyimiao

本品系用麻疹病毒沪-191減毒株接种原代鸡胚细胞和风疹病毒BRDII減毒株接种人二倍体细胞,经培养、收获病毒液,按比例混合配制,加适宜稳定剂冻干制成。为乳酪色疏松体,复溶后为橘红色或淡粉红色澄明液体。有效成分:麻疹和风疹减毒活病毒。 辅料:人血白蛋白、蔗糖、明胶、味精、尿素、精氨酸。 【成分和性状】

疫苗稀释剂:灭菌注射用水。

【接种对象】 8月龄以上的麻疹和风疹易感者。全年均适宜接种。

接种本疫苗后,可刺激机体产生抗麻疹病毒和风疹病毒的免疫力。用于预防麻疹和风疹。 【作用与用涂】

复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.2 lgCCID50。 【规格】 【免疫程序 和剂量】 【规

(1) 按标示量加入所附灭菌注射用水,待疫苗复溶并摇匀后使用。

(2) 于上臂外侧三角肌下缘附着处皮下注射0.5ml。

【不良反应】 常见不良反应:

高光小尺反应:(1) 一般接种疫苗后24小时内,在注射部位可出现疼痛和触痛,多数情况下于2~3天内自行消失。
(2) 一般接种疫苗后1~2周内,可能出现一过性发热反应。其中大多数为轻度发热反应,一般持续1~2天后可自行 缓解,不需处理,必要时适当休息,多喝水,注意保暖,防止继发感染;对于中度发热反应或发热时间超过48小时 者,可采用物理方法或药物对症处理。
(3) 皮疹: 一般接种疫苗后12天内可能轻微皮疹出现,出疹时间一般不超过2天,通常不需特殊处理,必要时可对症

治疗。

罕见不良反应:

重度发热反应:应采取物理方法及药物对症处理,以防高热惊厥。

型及**忍不良反应:** (1) 对数性皮疹: 一般接种疫苗后72小时内出现荨麻疹,出现反应时,应及时就诊,给予抗过敏治疗。

(2) 过敏性休克: 一般接种疫苗后1小时内发生。应及时注射肾上腺素等抢救措施进行治疗。 (3) 过敏性紫癜: 出现过敏性紫癜反应时应及时就诊,应用皮质固醇类药物给予抗过敏治疗,治疗不当或不及时有可能并发紫癜性肾炎。 (4) 出现血小板减少性紫癜。 (6) 原传上接触上海洋医验上,

(5) 成年人接种本疫苗后发生关节炎,大关节疼痛、肿胀。

忌】

(1) 已知对该疫苗所含任何成分,包括辅料、硫酸庆大霉素过敏者。 (2) 患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者。 (3) 妊娠期妇女。 (4) 免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫和制剂治疗者。 (5) 患脑病、未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者。

[注意事项]

(1)以下情况者慎用:家族和个人有惊厥史者、患慢性疾病者、有癫痫史者、过敏体质者、哺乳期妇女。(2) 开启疫苗瓶和注射时,切勿使消毒剂接触疫苗。(3) 疫苗瓶有裂纹、标签不清或失效者、疫苗复溶后出现浑浊等外观异常者均不得使用。(4) 疫苗瓶开启后应立即使用。 (4) 投笛瓶开启后应立即使用。 (5) 应备有肾上腺素等药物,以备偶有发生严重过敏反应时急救用。接种注射者在注射后应在现场观察至少30分钟。 (6) 注射免疫球蛋白者应至少间隔3个月以上接种本疫苗,以免影响免疫效果。 (7) 使用其他减毒活疫苗与接种本疫苗应至少间隔1个月;但本疫苗与腮腺炎减毒活疫苗可同时接种。 (8) 本品为减毒活疫苗,不推荐在该疾病流行季节使用。 (9) 育龄妇女注射本疫苗后,应至少3个月内避免怀孕。

于2~8℃避光保存和运输。 184 藏】

西林瓶, 卤化丁基橡胶塞。1瓶/盒(附稀释剂1支)。 【包 装】

【有效期】 18个月。

【禁

YBS05342019 【执行标准】

国药准字S20020087 【批准文号】